Lu une fois
Lu une 2e. fois

# Observations

## Sur quelques Playes du Bas-ventre.

### Par Mr. Devermale.

La Gastroraphie Est une Espece de double Synthêse particuliere aux playes penetrant dans l'abdomen qui Exigent absolument ce Secours, et qui d'un autre coté peuuent Etre néantmoins trés Simples quoyque Compliquées d'jssuë de quelque partie Contenuë. Telles Sont Celles où l'jntestin et l'Epiploon Sont Sortis Ensemble ou Separement Sans etre nullement lézés: et qui d'ordinaire n'Exigent que le Taxis pratiqué auec delicatesse; mais comme la lézion des parties aponéurotiques, notament celle du peritoine, peuuent produire de grands accidents les chirurgiens ne Scauroient être assés attentifs à ces Sortes de Blessures quelques Simples qu'elles Soient. Dailleurs cette mémbrane ne Se Réunissant jamais Sur elle même on doit toujours la Ménager lorsqu'on Est obligé de dilater les parties Contenantes, et faire Ensorte qu'elle puisse Se Coler à quelqu'une de Ses voisines. C'Est pour Satisfaire à ce precepte que j'ay Souuent tenté Son adhérence auec l'omentum comme l'on verra par le detail Suiuant.

L'Epiploon Etant une Substance adipeuse, Souple, molete, et trés flexible il n'Est pas Etonant de le voir le plus Souuent Sortir Seul, et même trés aisement par l'ouuerture d'une petite playe. dans ce cas je me Suis toujours Contanté de le Repousser légerement dans l'abdomen, quelque fois Sans dilater la playe, attentif de laisser une petite portion de Sa Substance, Etranglée par le peritoine, mise au niueau de la péau, et que j'ay Soin de Scarrifier quelques jours aprés auec le tranchant d'une lancette ou quelques touches de pierre jnfernale: Surtout quand la Cicatrice des angles de la Solution l'ont assujetie de façon à ne pouuoir plus Rentrer aisement dans le Bas-ventre. Lorsque l'jntestin accompagne ce Corps adipeux Sans Etre lézé je le fait doucement Rentrer aprés auoir dilaté, S'il Est nécessaire, tant Soit peu la diuision, et je Repousse Egalement l'Epiploon auec les mêmes précautions, que lorsqu'il est Sorti Seul, pour faciliter Son adhérence au peritoine et à la péau. je l'assujetis dans cette Situation par deux Especes d'ances fixées Sur deux petits Rouleaux de taffetas ciré posés transuersalemt. vers les angles de la playe; désorte que je ne faits vsage de la grande Suture que dans les cas qui l'Exigent absolument.

Parmy les Exemples que je pourois citer des heureux Succés de cette méthode

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
ARC 57 n°13

j'En Raporterai deux. Le premier C'Est vn Soldat qui ~~[illegible]~~ auoit Reçeu vn coup de Couteau à la partie laterale droite de l'abdomen à deux pouces vn peu obliquement au dessous de l'ombilic. cette playe presqu'orisontale auoit Environ deux pouces de longueur trés peu Béante et Simplement Compliquée de l'yssüe de l'Epiploon et de l'jntestin: je Repoussai doucement Celuy-cy et je fis Rentrer l'autre jusqu'a ce que sa Superficie fût au niveau de la péau; vn aide-chirurgien le ténoit fixé vers l'un des angles tandis-que vers l'autre je passois vne aiguille, Enfilée d'un quadruble fil ciré, à trauers quelques lignes de cette Substance adipeuse que j'assujetis en nouant les fils sur vn petit Rouleau de taffétas ciré posé transuersalement au dessus de la diuision et à deux ou trois lignes de son angle. je fis la même chose à la portion que l'aide-chirurgien tenoit fixée de l'autre coté, et celle qui Remplissoit le centre de la Solution fut légerement Scarrifiée auec vne lancete, Ensuite Recouuerte de la péau assujetie par vne Bandelette d'Emplatre d'andré de lacroix. j'auois soin de toucher de temps à autre l'Epiploon, du coté des angles, auec la pierre jnfernale dans les vuës d'y Exciter vne légere jnflamation et d'accelerer son adhérence. quand la cicatrice des angles Eût aproché les points de Suture je les coupai pour ne pas m'oposer aux progrés de la Réunion qui fût bientot assés ferme sous la Suture Seche, et qui laissa de chaque coté vn petit sinus qui ne fournirent pas vne Supuration proportionée à leur dimention. Désorte que les Pancements n'Eurent Rien de particulier; et le Blessé fût parfaitement guery le dix-Septieme jour par la Simplicité de cette methode Soutenüe de quelques lauements, de la phlebotomie, et d'un Regime Exact. jl est vray que ces sortes de Cicatrices sont vn peu Saillantes; mais elles ont l'auantage de s'oposer aux hernies ventrales que la lézion du Peritoine péut aisement permetre.

Le Segond Exemple Est Celuy d'un jeune garçon agé d'Environ douze a treize ans qui, sortant de diner l'Estomac farci d'alliments farineux et abreués de laitage, fût frapé au coté gauche, par son camarade, d'un coup de ganif (dont la lame auoit Environ Cinq lignes de largeur) à deux pouces vn peu au dessus et à coté de l'ombilic. Le Blessé poursuivit long-temps son agresseur sans s'aperçeuoir que la playe ~~etait~~ fut compliquée de l'yssüe d'Environ trois pouces de long de la Substance de l'omentum qui se trouua néantmoins en trés bon Etat trois ou quatre heures aprés que je fus appellé pour secourir ce Blessé. j'Employai d'abord la Simplicité du secours que je propose en pareil cas, et dans le cours des Pancements je n'Eus a Combatre qu'vn petit sinus cutané à l'angle jnferieur, et qui ne Rendit

pas la Cicatrice Tardive; elle fût parfaite le douzieme jour aprés Celuy de la Blesure qu'il fallut Rouvrir trois ans aprés a Cause de la presence d'un vers qui vraisemblablement avoit pris naissance dans la Substance de l'Epiploon,† Puisque ce Blessé m'Etant venu comuniquer que depuis prés d'un an et demi Son ventre S'Etoit Successivement gonflé; mais qu'avant de S'en apercevoir il avoit de temps en temps Senti certains chatouillements qui furent long temps aprés Suivis de quelques mouvements vermiculaires au tour de l'ombilic, Ensuite de démangéaisons et picotements à la Cicatrice où l'on distingoit depuis peu les contorsions d'un gros vers que je tirai aprés avoir divisé avec vne lancete les teguments qui le couvroient; je fis quelques mouchetures à la Substance de l'omentum pour faciliter Sa Réunion que je ne Deûs pas attendre long-temps. ce vers Encor vivant avoit Environ treize pouces de long, Sa grosseur étoit assés Semblable au tuyeau d'une plume à Ecrire, et l'on n'y Remarquoit Rien de Singulier.

Quoyqu'on Puisse présumer que le germe de cet jnsecte à pû être porté dans les Replis de la Substance adipeuse lorsque l'Epiploon Etoit hors du ventre et que le Blessé couroit aprés Son Agresseur:† je Suis néantmoins plus disposé à Croire qu'ayant eté Confondu avec les alliments il aura Echapé aux divers changements que ces coméstibles doivent prendre dans la Bouche, l'Estomac, et les jntestins d'où il aura Enfilé et Suivi la Route de chylification Sans etre Exposé à la métamorphose, Entrené Ensuite par le Torrent de la Circulation dans la portion jnferieure de l'aorte décendante, dans la Cœliaque et Ses Subdivisions jusqu'aux arteres gastro-Epiploïques, aura été Successivement poussé jusques dans le propre tissu de cette Substance adipeuse et deposé Sans alteration dans quelqu'vne de Ses cellules où la chaleur naturelle des Parties l'aura dévelopé. Peut etre même n'y etoit-il pas Seul? la Tumefaction du ventre, les chatouillements et les demangeaisons, quoyque de Signes trés Equivoques, le font dumoins Soubçoner, et Cela ne Seroit pas Etonant puisqu'on à deja trouvé de ces Sortes d'jnsectes dans le cerveau, le Pericarde, l'Estomac, les jntestins, la vessie, l'vterus, et plusieurs autres parties du Corps; Ainsy je ne déspere pas que quelqu'autre observation ne verifie tot ou tard cette Conjecture, qui nous anonce l'jmpossibilité de Remedier à cette Sorte d'jndisposition vermineuse, amoins que ces jnsectes ne Se frayent Eux même quelqu'jssue; car Celuy qui fait le Sujet de cette observation ne Seroit peut-etre jamais Sorti Si le hazard n'avoit avant Son Existence changé en quelque façon l'œconomie des parties où le germe de cet jnsecte fût Entrené.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Playes du bas ventre

No. 13